

***Phragmites australis* (Cav.) Trin. Ex St.**



**Sinonim:** *Arundo australis* Cav.

**Diğer İsimleri:** Türkçe: Kamış

**İngilizce:** Common reed

**Çevre İstekleri:** Suyun bulunduğu her türlü ortamda bulunur. Sulana veya taban arazilerde, göl, bataklık kenarları ve tahliye kanallarında bulunur: Davis (1965–1988) 'te A6 karesi için kayıt yoktur, fakat tarafımızdan saptanmıştır.

**Morfolojisi:** Çok yıllık, yan batık (Amphibi) su yabancı otudur. Kökle kuvvetli dallanmıştır. 1 - 2 m uzunluğa erişebilir ve rizomludur. Gövdesi yalı ve 3 m<sup>1</sup> ye kadar uzayabilen bir bitkidir. Yaprak diplerindeki dilcik 0,5 - 1 m boyunda olup tüylerden oluşmuş saçak biçimindedir. Genç devrede de yüzeyinde 1 cm'ye kadar uzayan bir sıra dik tüyler bulunur. Yaprak ayaları taban bölümlerinde daralmıştır, 60 x 3 cm' ye kadar büyüyebilir. Başak-(bileş salkım) 40 cm'ye kadar uzayabilir. Demetçiklerin taban bölümleri tüylüdür. Başakçıklar 3 - 6 çiçeklidir. Kavuzlar eşit değildir, pürüzlüdür. Alt kavuz 5 - mm boyda yumurtamsı, mızraksı, kısa sivri uçludur. En alttaki dış kavuz, iç kavuzun 2 katı boydadır. Başakçık ekseninde tüyler 7 – 9 mm'dir. Genellikle rizomla çoğalır.

**Diğerler:** Sepet yapımında kullanılmaktadır (**Özer ve ark., 1999**).

**Kaynak**

ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye'nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.