

**Galium aparine L.**



**Sinonimi:** *Galium spurium* subsp. *tenerum* (Schleicher) Nyman

**Diğer İsimleri:**

Türkçe: Yapışkan otu, Dil kanatan

**Çevre İstekleri:** Kurak olmayan, besin maddesince ve humusca zengin, derin, tınlı ve killi toprakları sever. Tahıllarda sık görülür. Tınlı toprakların tipik bitkisidir. Çukurova bölgesinde buğdayda bulunmuştur.

**Morfoloji :** Tek veya çok yıllık olup, 150 cm'ye ulaşabilir. Sap dört köşeli ve üzeri sert tüylü olup bunlar sayesinde tutunma (yapışma) özelliği vardır, diğer bitkilere tutunurlar, boğum yerlerinde bu tüyler daha fazladır. Yapraklar mekik şeklinde olup 6 - 9 adeti sap etrafını sarmış durumdadır. Yapraklar yumuşak, genellikle koyu yeşil ve üst yüzeyleri aynı şekilde tüylüdür, büyüklükleri 30-60 x 3-8 mm'dir. Çiçekler küçük, beyaz renkte, 2 mm genişliğindedirler. Karışık şemsiye şeklinde demet oluştururlar. Tohumlar 4-6 mm büyüklüğünde, yuvarlak ve üzeri tüylüdür.

**Diğerleri:** Tek bitki yaklaşık 300-400 tohum oluşturur. 1-5 cm toprak derinliğindeki tohumlar çimlenebilir. Toprak yüzeyindekiler çimlenmez. Tohumlarında dormansiye rastlanmaz, optimum çimlenme sıcaklığı 7-13°C'dir (min. 2-5°C, max. 20°C) (Uygur ve ark.,1986).

**Kaynak**

UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. ukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.