


Lactuca serriola L.



Sinonimi: *L. scarioa* L., *L. cyanea* C. Koch, *L. aculeata* sensu Boiss.

Diğer isimleri:

Türkçe: Dikenli yabancı marul, Yağ marulu

İngilizce: Oil lettuce, Prickly lettuce, Compass plant

Çevre İstekleri: Kuru, besin maddesince zengin, alkali, özellikteki toprakları sever. Azot ihtiva eden taşlı topraklarda rastlanır. Yol kenarları, döküntü alanları, tarla ve bahçe kültürlerinde sıklıkla rastlanır.

Morfolojisi: Tek veya iki yıllık bir bitki olup çok dallanır ve 25–150 cm boylanabilmektedir. Gövde genellikle beyazımtırak, yeşil, dik ve süt içerir. Yapraklar uzun, hafif parçalıdır. Yaprakların arka damarı ve gövde üzerinde dikenimsi tüyler vardır. Yapraklar gövdeden sapsız olarak çıkar. Çiçek tablası küçüktür ve açık sarı 7-15 çiçekten oluşmuştur. Temmuz - eylül aylarında çiçek açar. Tohumlar eliptik şekilli grimsi-siyah renkli, parlak, 3 - 4 mm uzunlukta, 0,9 - 1,5 mm genişlikte ve 0,4 - 0,5 mm kalınlıktadır. Tohumun alt kısmı dar ayrıca yan yüzlerde çok sayıda uzunlamasına çizgi bulunur. Pappusları beyaz ve narindir. Tohumla ürer (Özer ve ark., 1999).

Kaynak

ÖZER, Z., ÖNEN, H., TURSUN, N. ve UYGUR, F.N., 1999. Türkiye'nin Bazı Önemli Yabancı Otları (Tanımları ve Kimyasal Savaşları), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No: 38, Kitap Serisi No: 16.